



# Apus StabCys<sup>®</sup>

## Estabilidade superior e maior adesão ao tratamento dermatológico com Cisteamina HCL

Emulsão dermatológica de caráter catiônico que foi especialmente desenvolvida para estabilizar e mascarar o odor de enxofre da Cisteamina HCL, melhorando a performance despigmentante da formulação e a adesão do paciente.

### Estudo

Em 2020, Karrabi, M. e colaboradores publicaram um estudo clínico, randomizado e duplo-cego, que avaliou a eficácia da fórmula de Kligman modificada - MKF (hidroquinona 4%, ácido retinóico 0,05% e betametasona 0,1%) em comparação com o creme de cisteamina 5% no tratamento do melasma epidérmico. A redução percentual na pontuação mMASI (índice de gravidade da área de melasma modificado) foi aproximadamente 9% maior com o creme de cisteamina em comparação com MKF, e essas diferenças foram estatisticamente significativas ( $P = 0,005$  e  $0,001$ , respectivamente).

### Sugestão de Fórmula

#### Melasma epidérmico resistente

Cisteamina HCL - 5%  
Niacinamida PC - 4%  
Ác. Tranexâmico - 3%  
Glutathiona - 2%  
Bisabolol - 1%  
Apus StabCys qsp - 30g

**Aplicar sobre a pele durante 15 minutos e remover. Aumentar o tempo de exposição de forma gradativa até um máximo de 3 horas. Em caso de irritação, lavar imediatamente.**

*Karrabi, M. et al. Clinical Evaluation of Efficacy, Safety and Tolerability of Cysteamine 5% Cream in Comparison With Modified Kligman's Formula in Subjects With Epidermal Melasma: A Randomized, Double-Blind Clinical Trial Study. **Skin Res Technol.** 2020 Jun 25.*

Clique nos links abaixo para  
visitar nosso site e redes sociais!

[www.apus.ind.br](http://www.apus.ind.br)



sua logo  
aqui